



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА**

Советский пр-т, 58, г. Кемерово, 650064
тел. (3842) 36-42-84, факс (3842) 58-36-55
e-mail: depart@kuzdrav.ru
<http://kuzdrav.ru>

от 14.06.2022 № 4895

Руководителям медицинских
организаций

«О применении лекарственного препарата
Эвушелд (тиксагевимаб+цилгавимаб)»

Уважаемые руководители!

Ключевой стратегической целью государства в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), является снижение смертности населения, особенно среди пациентов из группы риска.

С целью доконтактной (предэкспозиционной) профилактики COVID-19 может использоваться комбинированное моноклональное антитело длительного действия (тиксагевимаб + цилгавимаб) Эвушелд у взрослых и детей (от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг), при условии отсутствия инфицирования SARS-CoV-2 и контакта с лицом, инфицированным SARS-CoV-2.

Применение препарата регламентировано временными методическими рекомендациями министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение НКВИ COVID-19» версия 15 от 08.02.2022г. Препарат назначается по решению врачебной комиссии и после получения информированного добровольного согласия пациента на применение препарата.

Доза препарата для взрослых и детей (в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг) составляет 150 мг для тиксагевимаба и 150 мг для цилгавимаба, которые необходимо вводить в виде двух отдельных последовательных внутримышечных инъекций. Противопоказан лицам с наблюдавшимися ранее тяжелыми реакциями гиперчувствительности, включая анафилактические реакции, на любой из компонентов препарата.

Приоритетными группами для доконтактной профилактики препаратом Эвушелд являются (но не ограничиваются этим):

1. Пациенты с первичным иммунодефицитом;
2. Пациенты с вторичным иммунодефицитом, обусловленным иммуносупрессией (получающие в настоящий момент или получившие в течение последних 12 месяцев терапию моноклональными антителами анти CD20, иммунохимиотерапию, цитостатики, ГИПБ и др.)

ЭП - 2

ГБУЗ ЦККСЛС
ВХ № 959-01-26 от 20.06.2022

3. Пациенты с ожирением (ИМТ >35);

4. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертензию;

5. Пациенты с хроническими заболеваниями легких, включая бронхиальную астму, ХОБЛ;

6. Пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа;

7. Пациенты с хроническими заболеваниями почек, включая заболевания, требующие диализа (4 стадия, СКФ <30 мл/мин/1,73 м²).

Применение препарата Эвушелд для приоритетных групп возможно в амбулаторных условиях поликлиник Кемеровской области по направлению терапевта или узкого специалиста до 01.07.2022.

Подробную информацию по применению препарата у взрослых и детей с 12 лет можно получить на вебинаре ФГБУ НМИЦ ФПИ МИНЗДРАВА РОССИИ по ссылке <https://events.webinar.ru/41733795/10758661>.

С уважением,
министр



Д.Е. Беглов

Исп Бородкина О.Д.
3842-54-89-97